

病虫害情报

第 1 期

岳阳市农业农村事务中心

2026 年 2 月 28 日

认真抓好油菜菌核病等病虫害防治工作

当前我市油菜大多处于始花期，是油菜病虫害防治的关键时期。据市、县近期调查，菌核病子囊盘已经萌发，每平方米子囊盘数量 1-5 个，菌核病开始发生，全市权平叶病株率 0.4%；霜霉病呈加重趋势，全市权平病株率 2.8%，最高 6.6%；蚜虫局部虫量较大，权平百株蚜量 435.8 头，最高 9000 头。

根据天气预报，3 月上旬我市阴雨天气较多，有利于菌核病、霜霉病的流行，请各县市区高度重视，加强指导，切实抓好油菜菌核病等病虫害防治工作。

防治建议：

1. 加强田间管理。及时清沟排渍，通风透气，摘除病老黄叶；普施硼肥，看苗追施尿素，增施磷钾肥，促苗情转化和增强抗逆性，提高结实率，防止早衰。

2. 适时有药防治。以油菜菌核病为防治重点，在始盛期结合喷施硼肥进行药剂防治，注意兼治油菜霜霉病、蚜虫，如花期雨水较多，应在盛花期补施第二次药剂。防治菌核病可选用丙硫菌唑、啶酰菌胺、

甲基硫菌灵等药剂；防治霜霉病可选用烯酰吗啉、啉菌酯、霜霉威盐酸盐等药剂；防治蚜虫选用吡蚜酮、吡虫啉等药剂。

公益提示：

1、融合推进统防统治和绿色防控，助力化学农药减量增效，促进农业绿色发展。

2、科学使用农药，注意农药使用安全间隔期。

3、严格实施植物检疫，守好农业生物灾害防控第一关。